

第2回 (7/16号)

水稲病害虫発生予察の結果について

本日は雨天のため病害虫発生予察は中止となりました。

① 生育状況

生育状況はどの地区も順調に生育しており、韮山地区や長岡地区の江間では中干し適期が近づいてきています。長岡地区の天野、大仁地区の白山堂では中干しに入っている圃場も見られ、長岡地区の小坂、大仁地区の神島では中干しに入っていました。山間地においては、中干しは終わっていました。

中干し適期は分けつ数が20本程度が目安となりますので、ご自身の圃場をご確認いただき、適期の作業をお願いいたします。

② 病害虫状況

今年は県内でイネカメムシの発生が多い傾向があります。管内では、まだ発生の確認はできていないですが、山間地ではカメムシの多発生も懸念されます。薬剤による防除を行う方は、スタークル粒剤の散布を推奨します。また、出穂10日前までに畦畔の除草を行い、畦畔雑草からの水田への飛び込みを防ぎましょう。

○スタークル粒剤

使用量：3kg/10a 3,520円/1袋 (3kg)

時期：出穂後7～10日後

備考：カメムシ以外にもウンカ類や
ヨコバイ、ニカメイチュウ等
の害虫にも効果あり。
2週間～3週間の残効あり

○ビームバシボン粉剤

使用量：3～4kg/10a 2,570円/1袋 (3kg)

時期：収穫14日前まで

備考：ウンカ類、カメムシ類にも効果あり
速効性あり、多発生時に散布

③ 中干し中に使用する除草剤

中干し中に、除草剤を散布する方は以下の除草剤を使用を検討ください。

○バサグラン粒剤 3～4kg/10a 3,510円/3kg

○2.4-Dアミン塩 80～120ml/10a (70～100ℓ で散布) 330円/100ml

○クリンチャーバスME液剤 500～700ml/10a (70～100ℓ で散布) 2,090円/500ml

※2.4-Dアミン塩について

使用時期は有効分けつ終止期～幼穂形成期前です。

幼穂形成後に使用すると、幼穂が形成しなくなるため注意してください。

イネカメムシ



問い合わせ：韮山営農経済センター 勝又 055-949-0055

※JAふじ伊豆ホームページでも確認頂けます。

※FM伊豆の国でも朝・昼放送を開始しました。